



CATIONORM®

CATIONORM  
CATIONORM  
CATIONORM  
CATIONORM  
CATIONORM  
CATIONORM

## Instrucciones de uso

### Colirio, emulsión

**Lea atenta y completamente este prospecto antes de empezar a utilizar este producto.**

Conserve este prospecto. Podría tener que volver a leerlo.

En caso de que tenga dudas, consulte con su médico o farmacéutico.

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

#### 1. Qué es Cationorm® y para qué se utiliza

Cationorm® es un colirio en forma de emulsión oftálmica estéril e hipotónica, sin conservantes, que se presenta como un líquido de aspecto lechoso.

**Cationorm® se utiliza para el tratamiento de los síntomas del ojo seco tales como la sensación de picor, comezón, ardor, o sensación de arenilla o de cuerpo extraño en los ojos.** Estos síntomas pueden estar causados por factores externos tales como el aire acondicionado, la contaminación, viajes en avión, cirugía refractiva, uso de pantallas de ordenador, llevar lentes de contacto, etc., o por enfermedades, como la disfunción de las glándulas de Meibomio.

Cationorm® hidrata, lubrica y protege la superficie ocular.

#### 2. Antes de utilizar Cationorm®

**No utilice Cationorm® si tiene alergia a cualquiera de los componentes del producto.**

**Este producto no está destinado al tratamiento de otras afecciones oculares.** Consulte a su médico o farmacéutico en caso de duda.

Si está utilizando simultáneamente otros colirios, debe esperar al menos 5 minutos entre la aplicación de cada colirio. Se recomienda que Cationorm® sea el último en administrar.

Cationorm® es compatible con todos los tipos de lentes de contacto.

#### 3. Cómo utilizar Cationorm®

##### USO OCULAR.

La dosis recomendada es de 1 gota en cada ojo, de 1 a 4 veces al día.

Instrucciones de uso:



- Lávese las manos.
- Antes del primer uso del frasco del colirio, retire el anillo de sellado de la tapa tirando de su extremo.



- Abra el frasco tirando suavemente de la tapa.
- La primera vez que utilice el frasco, deberá realizar un cebado/prueba para familiarizarse con la

presión/compresión y con el tiempo necesarios para administrar una gota. Después de quitar el tapón, sostenga el frasco sobre una servilleta de papel o una papelería y apriete suavemente el frasco para administrar 1-2 gotas sobre la servilleta de papel o papelería.

Esto le mostrará la fuerza/compresión necesaria para administrar una sola gota, y el frasco ya estará listo para su uso.

- Hay volumen de producto suficiente en el frasco para administrar la dosis diaria recomendada.

- No toque la punta del gotero del frasco, ya que esto podría contaminar la emulsión.



- Para administrar el producto, incline la cabeza hacia atrás y sostenga el frasco por encima del ojo.

- Tire suavemente del párpado inferior hacia abajo y mire hacia arriba.

- Presione el frasco suave y uniformemente por la zona central y deje caer una gota sobre la superficie del ojo. No toque el ojo ni las pestañas con la punta del frasco.

Tenga en cuenta que, entre que aprieta el frasco y sale la gota, pueden transcurrir unos segundos.


- No apriete el frasco con demasiada fuerza.
- Parpadee varias veces para que la gota se extienda por el ojo.
- Es posible que cueste más apretar el frasco cuando esté casi vacío.



- Después del uso y antes de volver a poner el tapón, agite el frasco una vez con la punta del gotero mirando hacia abajo para eliminar el líquido que pueda quedar en la punta. Esto

se hace para limpiar la punta antes de administrar la siguiente gota. No limpie la punta del gotero con la mano ni con ningún objeto.

- Intente no tocar la punta del gotero. Espere 3 segundos antes de administrar una gota en el otro ojo.



- Después de cada uso, asegúrese de cerrar bien el frasco con el tapón.
- Conserve el frasco en la caja suministrada cuando no lo esté usando.

#### NO utilice Cationorm® una vez transcurridos 3 meses desde la primera apertura del frasco.

Utilizar un frasco abierto durante más de 3 meses desde de la primera apertura expone el producto a un alto riesgo de contaminación.

#### 4. Cuáles son los posibles efectos adversos

En casos muy raros, puede experimentar molestias transitorias en el ojo, como por ejemplo: irritación, dolor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, picazón, lagrimeo, sensación de ardor, visión turbia transitoria, o inflamación o hinchazón del párpado. Estos son también síntomas típicos de la enfermedad del ojo seco y se encuentran asociados a las afecciones médicas subyacentes de los pacientes que sufren la enfermedad del ojo seco. **SI DETECTA CUALQUIER EFECTO ADVERSO QUE NO FIGURE EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MÉDICO O FARMACEÚTICO.**

#### 5. Cómo conservar Cationorm®

Conserve el frasco en el envase de origen a una temperatura inferior a 30 °C.

No lo almacene en una habitación húmeda. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice el frasco si observa signos externos de deterioro.

No lo utilice después de la fecha de caducidad impresa en la caja. Utilicelo en el plazo de 3 meses tras la primera apertura.

#### Escriba a continuación la fecha en la que abrió el frasco por primera vez:

*Cuidemos el medio ambiente. No tire el envase a la basura, colabore a su reciclado depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia.*

Cationorm® contiene: aceites minerales, glicerol, tiloxapol, poloxamer 188, tris-hidrocloruro, trometamina, cloruro de cetalconio (como agente catiónico) y agua purificada.

Un frasco de Cationorm® contiene 10 ml de emulsión estéril.

**Si necesita más información, póngase en contacto con su médico/farmacéutico o con la oficina de Santen en [www.santen.es](http://www.santen.es)**



0459



# Santen

**Este prospecto se revisó por última vez en Agosto de 2022.**

**Fabricante:**

Santen  
Bâtiment Genavenir IV  
1 rue Pierre Fontaine  
91000 EVRY COURCOURONNES  
Francia

#### Leyenda:

<b>Símbolo</b>				
<b>Significado</b>	Fabricante	Almacenar por debajo de 30 °C	Debe utilizarse en un plazo de 3 meses tras la primera apertura	Estéril utilizando técnica aséptica
<b>Símbolo</b>				
<b>Significado</b>	Código de lote	Fecha de caducidad	Consultar el prospecto antes de utilizar	No utilizar si el sistema de barrera estéril o el envase del producto están dañados